

# ສານໄຣຊືນ (Ricin)



## ໄຣຊືນ ແມ່ນຫຍັງ?

ໄຣຊືນ ແມ່ນ ຢາເບື້ອທີ່ມີພິດຮ້າຍແຮງໝາຍ.  
ມັນເຮັດມາຈາກພິດທີ່ສ້າງສາມນີ້ມັນ,  
ທີ່ເອີ້ນວ່າ ຕາສເຕີ (castor).



## ໄຣຊືນ ເປົ່ງມີລັກສະນະແນວໃດ?

ຖ້າວ່າ ຜູ້ກໍາກຳນັກຮ້າຍເອົາໄຣຊືນມາໃຊ້ເປັນຢາພິດ.


ມັນຈະມີລັກສະນະເປັນ:

- ໝອກ ຫຼື ຜົງ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດຫາຍໃຈອີ້າໄດ້, ຫລື
- ຜົງ ເຊິ່ງສາມາດວາງໃສ່ໃນອາຫານ ຫຼື ນັ້ນ.

ຖ້າໄຣຊືນ ທາກເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນອາຍ, ຫຼືເອົາໃສ່  
ໃນອາຫານ ຫຼື ນັ້ນ, ທ່ານບໍ່ສາມາດເປົ່ງເຫັນ ຫຼື ໄດ້ກົ່ນມັນ.

## ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະຕາຍປ່ອ ຖ້າຫາກທຶກສານໄຣຊືນ?

ຕາຍ, ທ່ານສາມາດຕາຍໄດ້ພາຍໃນຂ່ວໂມງ, ແຕ່ວ່າ ຖ້າຫາກ  
ທ່ານມີຂູ້ວິດຢູ່ໄດ້ 3 ເທິງ 5 ວັນ, ທ່ານອາດຫາຍປ່ວຍຈາກ  
ພະຍາດນີ້ໄດ້



## ອາການຂອງການທຶກພິດຈາກສານໄຣຊືນ ເປັນແນວໃດ?

ຖ້າຫາກທ່ານຫາຍໃຈເອົາສານໄຣຊືນ, ອາການທີ່ມີດໄດ້ແກ່:

- ຫາຍໃຈຝຶດ
- ມີໃຈ້
- ໄອ
- ປວດຮາກ

ຈາກນັ້ນ, ທ່ານອາດມີເຮືອອອກຢ່າງໝວງຫາຍ, ມີຫາດແໜ້ວ  
ໃນປອດຂອງທ່ານ, ມີບັນຫາຕໍ່ການ ຫາຍໃຈຢ່າງຮຸນແຮງ,  
ແລ້ວຜົວໜັງຂອງທ່ານອາດ ກາຍເປັນສີຄົ້ງກໍາ. ໃນຫີ່ສຸດ,  
ທ່ານຈະຍຸດຫາຍໃຈ ແລະຕາຍ.

ຖ້າຫາກທ່ານ ກິນກິນ ສານໄຣຊືນ, ອາການທີ່ມີດໄດ້ແກ່:

- ຮາກ
- ຖ້າຍຖອກຫຼອງ (ບາງເຫື່ອມີເລືອດອອກມານຳ)
- ປະສາດໝອນ
- ເປັນບ້າໝູ (ຮ່າງກາຍຈະສັ່ນ)
- ຍົງວອອກເລືອດ

ພາຍໃນໝາຍວັນ, ຕັບ, ມ້າມ ແລະ ພາກໄຂ້ຫຼັງຂອງທ່ານ  
ຈະຍຸດເຮັດວຽກ ແລະຫານຈະຕາຍ.

ຖ້າຫາກ ສານໄຣຊືນ ສຳຜັດ ຜົວໜັງ ຫຼື ຕາຂອງທ່ານ, ຜົວໜັງ  
ແລະຕາຈະກາຍເປັນສີແຕງ ແລະ ທ່ານຈະຮູ້ສີກາເຈັບແສບ.

ຂ້າພະເຈົ້າຄວນເຮັດແນວໃດ ຖ້າຫາກຂ້າພະເຈົ້າຄືດວ່າ  
ໄດ້ສຳຜັດກັບສານໄຣຊືນ?

ໂທລອຫາ 911.

ຈາກນັ້ນ, ຖ້າຫາກທ່ານ ຫາຍໃຈເອົາຫຼື ສຳຜັດ ກັບສານໄຣຊືນ,  
ຈຶ່ງປະຕິບັດຕາມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຢ່າງທັນທີ

- ໝີໄປ. ຖ້າຫາກທ່ານຢູ່ປະກົດຫຼອງ, ໃຫ້ນີ້ໄປຈາກບ່ອນນັ້ນ.  
ຖ້າຫາກທ່ານຢູ່ໃນຫຼອງ, ໃຫ້ນີ້ອອກໄປຂ້າງນອກ.
- ແກ້ເຄື່ອງນຸ່ງຂັ້ນນອກສຸດຂອງທ່ານອອກ. ຢ່າເອົາຜົມາ  
ຄຸມຫົວຂອງທ່ານເດັດຂາດ ໃຫ້ແກ້ວອກແທນ.  
ພະຍາຍາມຢ່າງແຕະຕອງ ເຄື່ອງນຸ່ງຂັ້ນນອກຂອງທ່ານ.  
ເພາະມັນ ອາດມີສານໄຣຊືນຕິດຢູ່.
- ລ້າງຕົມໂຕຂອງທ່ານ. ໃຫ້ໃຊ້ສະບູ ແລະນຳໝາຍງ່າ.  
ຖ້າຫາກຕາຂອງທ່ານແສບໄຫ້ ຫຼື ຕາມືວ,  
ໃຫ້ລ້າງດ້ວຍນີ້ສະອາດປະມານ 10 ເທິງ  
15 ນາທີ.
- ຖ້າຫາກທ່ານໃສ່ແວ່ນຕາ, ໃຫ້ລ້າງມັນດ້ວຍສະບູ  
ແລະນຳ້. ທ່ານສາມາດໃຊ້ໄດ້ຕໍ່ຫຼັງຈາກ  
ລ້າງແລ້ວ. ຖ້າຫາກທ່ານໃສ່ຄອນແຫັກເລັ້ນ,  
ໃຫ້ປິດອອກ ແລະຢ່າໃສ່ຄືນອີກ.
- ໃຫ້ຖົມເຄື່ອງນຸ່ງຂອງທ່ານ. ຫຼັງຈາກທ່ານລ້າງຕົມໂຕແລ້ວ,  
ໃຫ້ໃຊ້ຖົມຢ່າງ ຫຼື ຖົງຢ່າງ ພາສະຕິກໃນມີ ເພື່ອຈັບເຄື່ອງ  
ນຸ່ງທ່ານໄດ້ໃສ້ນັ້ນ ເຂົ້າໃນຖົງຢ່າງພາສະຕິກ. ພ້ອມນັ້ນ,  
ໃຫ້ເອົາສົ່ງຂອງອື່ນໆທີ່ສຳຜັດກັບເຄື່ອງນຸ່ງຂອງທ່ານເຂົ້າໃນ  
ຖົງຢ່າງພາສະຕິກ. ຖ້າຫາກທ່ານໃສ່ ຄອນແທກເລັ້ນ,  
ໃຫ້ເອົາຖົມໃສ່ຖົງຢ່າງພາສະຕິກນຳເລີຍ.
- ປິດຖົງຢ່າງພາສະຕິກໃຫ້ແຈບດີ. ຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ເອົາຖົມນັ້ນ  
ໃສ່ໃນຖົງຢ່າງພາສະຕິກໃໝ່ ຊອນອີກເຫຼືອນິ່ງ. (ແຈ້ງບອກ  
ຜູ້ຮັບເລື້ອງສຸກເສີນວ່າ ທ່ານປະຖົງພາສະຕິກໄວ້ບ່ອນໄດ້.)

ຖ້າຫາກທ່ານກິນກິນສານໄຣຊືນ:



- ໂທຣ 911.
- ຢ່າກິນ ຫຼື ເປົ່ງມີຫຍັງເຂົ້າໄປຕື່ມ.
- ຢ່າພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຕົນຮາກອອກມາ.

## ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕົມ

ໂທຣຖາມ CDC ເພື່ອຂໍ້ມູນເປັນພາສາອັງກິດ ຫຼື  
ແອສປາຍໂຍນ:

800-CDC-INFO (800-232-4636)

888-232-6348 (TTY)

ຫຼື ເຂົ້າເປົ່ງໃນອິນເຕີເນັດ: [www.cdc.gov/ricin](http://www.cdc.gov/ricin)  
[www.dhs.ca.gov/epo](http://www.dhs.ca.gov/epo)