

# ພະຍາດໂບທູລີຊິມ (Botulism)



ໂບທູລີຊິມແມ່ນພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອລ່ອຍ. ພະຍາດນີ້ເກີດຈາກແບັກແທເລຍ. ພະຍາດນີ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ຊະນິດ:

- ໂບທູລີຊິມໃນອາຫານເປັນພິດ
- ໂບທູລີຊິມແອນໂອຍ, ແລະ
- ໂບທູລີຊິມໃນບາດແຜ.

## ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເປັນໂບທູລີຊິມໃນອາຫານໄດ້ແນວໃດ?

ທ່ານຈະເປັນ, ຖ້າທ່ານກິນອາຫານທີ່ຕິດເຊື້ອແລ້ວ.

ຄົນສ່ວນຫລາຍມີອາການພາຍໃນ 12 – 36 ຊົ່ວໂມງ.

ໃນບາງກໍລະນີອາດຈະໃຊ້ເວລາ 2 ອາທິດຈຶ່ງມີອາການ.

ຖ້າຫລາຍຄົນກິນອາຫານແບບດຽວກັນນັ້ນ ຫາກບໍ່ສະບາຍ, ນັ້ນກໍສະແດງວ່າອາຫານນັ້ນອາດຈະຕິດເຊື້ອດັ່ງກ່າວ.

ໃນກໍລະນີແບບນີ້, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກຈະລົງກວດກາເຫດການ. ອາດເປັນໄປໄດ້ທີ່ຜູ້ກໍານານຮ້າຍໄດ້ເອົາເຊື້ອຈຸລິນຊີເຫລົ່ານີ້ໃສ່ໃນອາຫານ.

## ຜູ້ໃດອາດຈະເປັນໂບທູລີຊິມແອນໂອຍ?

ພວກແອນໂອຍ, ໂດຍສະເພາະອາຍຸ 6 ເດືອນ ຫລືຕໍ່ກວ່ານັ້ນ ສາມາດເປັນພະຍາດນີ້ຈາກອາຫານທີ່ຕິດເຊື້ອແລ້ວ ຫລືຈາກຂີ້ຜຸ່ນໄດ້. ແອນໂອຍທີ່ບໍ່ໄດ້ກິນນົມແມ່ແລະແອນໂອຍທີ່ກິນນໍ້າເຜິ້ງ ມີໂອກາດຫລາຍກວ່າທີ່ຈະເປັນພະຍາດໂບທູລີຊິມແອນໂອຍ.

## ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເປັນໂບທູລີຊິມໃນບາດແຜໄດ້ແນວໃດ?

ທ່ານສາມາດເປັນພະຍາດນີ້ໄດ້, ຖ້າຫາກແບັກແທເລຍຖືກບາດແຜ ຫລື ຮອຍບາດທີ່ບໍ່ໄດ້ປົກໄວ້.

## ພະຍາດໂບທູລີຊິມແມ່ນພະຍາດທີ່ຕິດຕໍ່ບໍ່?

ບໍ່. ທ່ານບໍ່ສາມາດຕິດພະຍາດນີ້ຈາກຄົນອື່ນ.

## ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຕິດພະຍາດໂບທູລີຊິມໄດ້ແນວໃດ?

ສ່ວນຫລາຍ, ທ່ານສາມາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຕິດພະຍາດໂບທູລີຊິມໂດຍເຮັດສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ຫລີກລ້ຽງອາຫານກະບໍ່ອັດບໍ່ແຈບ ຫລື ອາຫານບູດເນົ່າ
- ລ້າງບາດແຜໃຫ້ສະອາດ, ແລະ
- ບໍ່ເອົານໍ້າເຜິ້ງໃຫ້ແອນໂອຍກິນ.

## ອາການຂອງພະຍາດໂບທູລີຊິມເປັນແນວໃດ?

ທ່ານອາດຈະມີ:

- ບັນຫາກັບສາຍຕາເຊັ່ນ ເບິ່ງເຫັນເປັນເງົາຊ້ອນຫລືສາຍຕາມົວ ແລະ ຫນັງຕາຍາມລົງ,
- ເວົ້າລົວ,
- ກິນນໍ້າລາຍຍາກ, ປາກແຫ້ງ, ແລະ
- ກ້າມເນື້ອເລີ່ມອ່ອນເພຍຕັ້ງແຕ່ປ່າຫລືກົກແຂນ ແລ້ວລົງໄປຕາມຮ່າງກາຍ.
- ກ້າມເນື້ອລະບົບຫາຍໃຈລ່ອຍ. ທ່ານອາດຈະເຊົາຫາຍໃຈແລະເຖິງແກ່ຊີວິດ.

## ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຕາຍຍ້ອນພະຍາດໂບທູລີຊິມບໍ່?

ແມ່ນ. ທ່ານອາດເຊົາຫາຍໃຈແລະເຖິງແກ່ຊີວິດໄດ້, ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມ ຊ່ວຍເຫລືອໂດຍທັນທີ.

ທ່ານອາດມີອາການດີຂຶ້ນ ຖ້າໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫລືອໂດຍທັນທີ. ຖ້າປອດຂອງທ່ານເຊົາເຮັດວຽກ, ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈເພື່ອຈະຫາຍໃຈໄດ້. ມັນອາດໃຊ້ເວລາຫລາຍອາທິດ ຫລືຫລາຍເດືອນກວ່າຈະຟື້ນຄົນເປັນປົກກະຕິ.

## ຈະເຮັດແນວໃດ ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຂ້າພະເຈົ້າຕິດພະຍາດໂບທູລີຊິມ?

ຂໍໃຫ້ຕິດຕໍ່ກັບທ່ານໝໍປະຈໍາຄອບຄົວຫລືໂຮງໝໍທັນທີ. ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບຢາສະເພາະ. ຢານັ້ນອາດຈະບັນເທົາ ອາການ ຖ້າທ່ານກິນຢານັ້ນທັນທີ.



## ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຂໍໃຫ້ຕິດຕໍ່ ...

ໂທຫາ CDC (Centers for Disease Control) ສໍາລັບຂໍ້ມູນທີ່ເປັນພາສາອັງກິດ:

800-CDC-INFO (800-232-4636)

888-232-6348 (TTY)

ຫລືເຂົ້າໄປ: [www.bt.cdc.gov/agent/botulism](http://www.bt.cdc.gov/agent/botulism)  
[www.dhs.ca.gov/epo](http://www.dhs.ca.gov/epo)