


Ciprofloxacin Suspension for Babies

How to give Ciprofloxacin Suspension To Your Child


- Mix the medicine as shown to the right.
- Shake the medicine for about 15 seconds before measuring out the next dose.
- After it is mixed, keep the medicine in the refrigerator. It may be kept covered in the refrigerator for 14 days.
- **Give two doses each day. Give one in the morning and one in the evening.**
- Measure the amount of liquid medicine for your child's dose, as marked below.
- To make it taste better, the suspension can be mixed with a small amount of food or juice. **Be sure the child takes all this mixture to get the full dose of medicine.**

Child's weight	Give this much	How often each day
7-12 pounds (3-5 kg)	1 ml	Two times
13-22 pounds (6-10 kg)	2 ml	Two times
23-33 pounds (11-15 kg)	3 ml	Two times
34-44 pounds (16-20 kg)	4 ml	Two times


Mixing Instruction:




1. The small bottle contains the medicine. **Do not chew the medicine.** Mix the medicine with the liquid in the larger bottle.



2. Open both bottles. Press down on the cap as you twist it to the left.



3. Pour the medicine into the larger bottle of liquid. **Do not add water or any other liquid.** Be sure you get all the medicine out of the small bottle.




4. Close the large bottle. Be sure the cap is on tight. Shake the bottle well for about 15 seconds. The medicine is ready for use.

아기들을 위한 시프로플록사신 현탁액


아기에게 시프로플록사신 현탁액을 먹이는 방법

- 오른쪽 그림과 같이 약을 섞으십시오.
- 복용량을 측정하기 전에 약을 15 초가량 흔드십시오.
- 혼합이 잘 되었으면 약을 냉장고에 보관하십시오. 뚜껑을 덮어두면 냉장고에 14 일까지 보관할 수도 있습니다.
- 하루에 두 번 약을 주십시오. 아침에 한 번 저녁에 한 번 주십시오.
- 아래 표시한대로 어린이에게 먹일 복용량을 측정하십시오.
- 맛을 좀 더 좋게 하려면 현탁액에 약간의 음식이나 주스와 섞어도 됩니다. 필요한 복용량을 모두 섭취하려면 섞은 액을 모두 마셔야 합니다.


섞는 방법




1. 작은 병 안에 약이 들어있습니다. **약을 썹지 마십시오.** 큰 병 안에서 약을 액과 함께 섞습니다.



2. 병을 둘 다 엽니다. 뚜껑을 꼭 누른 상태에서 왼쪽으로 비튼다.



3. 약을 액에 들어있는 큰 병에 부어 넣으십시오. **물이나 그밖에 다른 액을 첨가하지 마십시오.** 반드시 작은 병 안의 약을 모두 따르십시오.



4. 큰 병을 닫으십시오. 뚜껑이 꼭 닫혔는가 확인합니다. 병을 약 15 초간 잘 흔드십시오. 이제 약을 사용할 준비가 되었습니다.

자녀의 체중	이 만큼 주십시오	하루에 얼마나 자주
3-5 kg (7-12 파운드)	1 ml	2 회
6-10 kg (13-22 파운드)	2 ml	2 회
11-15 kg (23-33 파운드)	3 ml	2 회
16-20 kg (34-44 파운드)	4 ml	2 회

Directions for Anthrax Prevention for Children Under 45 Pounds
using Ciprofloxacin 250mg/5ml Suspension. Korean

Adapted by the Communicable Disease Prevention Team of Columbus Public Health from protocols developed by Ohio Dept. of Health 3/08