

Ciprofloxacin Suspension for Babies





How to give Ciprofloxacin Suspension To Your Child

- Mix the medicine as shown to the right.
- Shake the medicine for about 15 seconds before measuring out the next dose.
- After it is mixed, keep the medicine in the refrigerator. It may be kept covered in the refrigerator for 14 days.
- **Give two doses each day. Give one in the morning and one in the evening.**
- Measure the amount of liquid medicine for your child's dose, as marked below.
- To make it taste better, the suspension can be mixed with a small amount of food or juice. **Be sure the child takes all this mixture to get the full dose of medicine.**

Child's weight	Give this much	How often each day
7-12 pounds (3-5 kg)	1 ml	Two times
13-22 pounds (6-10 kg)	2 ml	Two times
23-33 pounds (11-15 kg)	3 ml	Two times
34-44 pounds (16-20 kg)	4 ml	Two times

Mixing Instructions:

1. The small bottle contains the medicine. **Do not chew the medicine.** Mix the medicine with the liquid in the larger bottle.
2. Open both bottles. Press down on the cap as you twist it to the left.
3. Pour the medicine into the larger bottle of liquid. **Do not add water or any other liquid.** Be sure you get all the medicine out of the small bottle.
4. Close the large bottle. Be sure the cap is on tight. Shake the bottle well for about 15 seconds. The medicine is ready for use.




Суспензия Ципрофлоксацина для младенцев

Как давать суспензию Ципрофлоксацина Вашему ребенку

- Смешайте лекарство, как это показано справа.
- Взболтайте лекарство в течение примерно 15 секунд до того, как отмерить необходимую дозу.
- После перемешивания поместите лекарство в холодильник. Его можно хранить в холодильнике в закрытой упаковке в течение 14 дней.
- **Каждый день давайте две дозы. Давайте одну дозу утром, а вторую – вечером.**
- Отмерьте такое количество жидкого лекарства для Вашего ребенка, которое отмечено ниже.
- Для того чтобы улучшить вкус, суспензию можно смешать с небольшим количеством пищи или сока.
Удостоверьтесь в том, что ребенок принял всю смесь, чтобы он получил полную дозу лекарства.

Вес ребенка	Количество жидкого лекарства	Сколько раз в день
3-5 кг (7-12 фунтов)	1 мл	Два раза
6-10 кг (13-22 фунтов)	2 мл	Два раза
11-15 кг (23-33 фунтов)	3 мл	Два раза
16-20 кг (34-44 фунтов)	4 мл	Два раза


Инструкция по смешиванию




1. Лекарство содержится в маленькой бутылочке.

Не употребляйте лекарство неразбавленным.

Смешайте лекарство с жидкостью в бутылке большего объема.




2. Откройте обе бутылочки. Для этого надавите на крышку и поверните ее влево.



3. Влейте лекарство в большую бутылочку с жидкостью. **Не добавляйте воды или другой жидкости.**

Удостоверьтесь, что Вы вылили все лекарство из маленькой бутылочки.



4. Закройте большую бутылочку. Удостоверьтесь, что она закрыта плотно. Хорошо взболтайте лекарство в течение примерно 15 секунд. Лекарство готово к употреблению.