



Giving Doxycycline Pills to Your Child



- The amount of medicine depends on the child's weight.
- For a child who weighs less than 55 pounds (25kg), you should use the Doxycycline Suspension for your child, not the pills. Please refer to that page for directions.
- **Give two doses each day. Give one in the morning and one in the evening.**
Give the amount marked below for your child.
- To make it taste better, the medicine can be crushed and mixed with **a small amount** of food or juice. **Be sure the child takes all this mixture to get the full dose of medicine.**

Child's weight	Morning Dose Amount	Evening Dose Amount
Under 55 pounds (under 25 kg)	See the page about Doxycycline Suspension for medicine directions	
55-80 pounds (25-36 kg)	$\frac{1}{2}$ pill	$\frac{1}{2}$ pill
81-98 pounds (37-44 kg)	1 pill	$\frac{1}{2}$ pill
99 pounds or more (45kg or more)	1 pill	1 pill



Administración de pastillas de doxiciclina a su hijo

- La cantidad del medicamento depende del peso del niño.
- Para un niño que pesa menos de 25 kg (55 libras), debe usar la suspensión de doxiciclina, no las pastillas. Consulte dicha página para ver las instrucciones.
- **Administre dos dosis al día, una en la mañana y otra en la noche.** Dele a su hijo la cantidad que se indica a continuación.
- Para que tenga mejor sabor, el medicamento se puede triturar y mezclar con **una pequeña cantidad** de alimento o jugo. **Asegúrese de que su hijo tome toda la mezcla para obtener la dosis completa del medicamento.**

Peso del niño	Cantidad para dosis de la mañana	Cantidad para dosis de la tarde
Menos de 25 kg (menos de 55 libras)	Consulte la página sobre suspensión de doxiciclina para ver las indicaciones del medicamento	
25 a 36 kg (55 a 80 libras)	½ pastilla	½ pastilla
37 a 44 kg (81 a 98 libras)	1 pastilla	½ pastilla
45 kg o más (99 libras o más)	1 pastilla	1 pastilla