

야토병(Tularemia)은 매우 위험한 병입니다. 이 병은 쥐, 토끼 및 다른 야생동물들에서 때때로 발견되는 박테리아에 의해 발생합니다.

어떻게 야토병에 걸리니까?

다음과 같은 경우에 야토병에 걸릴 수 있습니다.

- 박테리아에 감염된 죽은 동물을 만지는 경우
- 박테리아에 감염된 진드기, 사슴파리 또는 다른 벌레에 물리는 경우
- 오염된 음식이나 물을 먹고 마시는 경우, 또는
- 야토병을 일으키는 박테리아를 흡입하는 경우

야토병은 위험합니까?

그렇습니다. 특별한 항생제를 사용하여 즉시 치료를 받지 않으면 사망할 수 있습니다. 항생제 치료를 받으면 생존할 가능성이 많습니다.



야토병에 걸리면 어떤 증상이 나타납니까?

첫 증상은 보통 3-5 일 이내에 나타납니다.

- 갑작스러운 고열, 오한
- 임파선이 붓고 아픔
- 두통
- 설사
- 근육통과 관절통
- 마른 기침
- 쇠약

감염된 경로에 따라 다른 증상들이 나타날 수도 있습니다. 피부나 입이 헐고, 목이 아프고, 눈, 또는 목, 겨드랑이, 사타구니의 임파선이 붓거나 아플 수 있습니다.

나중에 폐렴에 걸리거나, 숨가쁨, 가슴 통증, 기침을 할 때 피 섞인 가래가 나오는 것과 같은 다른 증상이 나타날 수 있습니다. 호흡이 멎어서 사망하는 환자도 있습니다.

야토병은 전염됩니까?

아니오. 야토병은 다른 사람으로부터 전염되지 않습니다.

백신이 있습니까?

없습니다.

야토병에 걸렸다고 생각되면 어떻게 해야 합니까?

의사 또는 병원에 즉시 전화하십시오.



어떻게 감염을 예방할 수 있습니까?

다음과 같은 조치를 취할 수 있습니다.

- 벌레에 물리지 마십시오.
 - 피부에 디트(DEET)가 함유된 방충제를 바르십시오.
 - 옷에 퍼메트린이 함유된 방충제를 뿌리십시오.
- 비누와 따뜻한 물로 손을 자주 씻으십시오(특히 죽은 동물을 만진 후에).
- 음식을 항상 완전히 익혀서 드십시오.
- 수돗물을 안전한 상수원으로부터 공급 받고 있는지 확인하십시오.

가축이나 애완동물(특히 토끼, 쥐 및 다른 쥐과의 동물)에게 열이 나거나, 체중이 줄거나, 임파선이 붓거나, 피부가 허는 증상이 나타나면 의사에게 전화하십시오.

테러리스트들이 야토병을 무기로 사용할 수 있습니까?

그럴 가능성은 있으나, 충분한 양의 야토병 박테리아를 공중에 살포하기는 매우 어려울 것입니다.

더 자세한 정보를 원하시면...

아래의 번호로 CDC (Centers for Disease Control)에 전화하여 영어로 도움을 받으십시오.

800-CDC-INFO (800-232-4636)
888-232-6348 (TTY)

또는 다음의 웹사이트를 방문하십시오.
www.bt.cdc.gov/agent/tularemia
www.dhs.ca.gov/epo