

사린이란 무엇입니까?



사린은 위험한 인공 화학물질입니다. 이 물질은 화학무기로 사용할 수 있습니다.

어떻게 사린에 접촉할 수 있습니까?

테러리스트들은 사린을 다음과 같이 무기로 사용할 수 있습니다.

- 흡입할 수 있는 가스
- 음식이나 물에 넣을 수 있는 액체, 또는
- 사람들이 만지는 물건에 묻힘

사린은 색깔, 맛 또는 냄새가 없는 투명한 액체입니다. 이 물질은 쉽게 기체로 변할 수 있습니다.

사린에 중독되면 어떤 증상이 나타납니까?

다음과 같은 증상이 나타납니다.

- 콧물이 흐르고 눈물이 남
- 작은 점 모양의 동공, 눈의 통증, 흐릿한 시야
- 침을 흘리고 땀이 남
- 기침, 가슴 답답함, 가쁜 숨
- 설사, 잦은 소변
- 혼란, 현기증, 쇠약
- 두통, 메스꺼움, 구토 및/또는 복부 통증
- 빠르거나 느린 심장 박동, 고혈압 또는 저혈압

사린을 **흡입하면** 몇 초 내에 증상이 시작됩니다.

사린을 **삼키면** 18시간이 지난 후에 증상이 시작되는 경우도 있습니다.

사린이 피부에 **닿으면** 땀이 나고 몸에 경련이 일어납니다.

사린에 중독되면 사망할 수 있습니까?

다량의 사린에 중독되면 사망할 수 있습니다. 지속적인 영향이 없는 소량에 중독되면 회복되는 경우가 많습니다.

사린에 중독되었다고 생각되면 어떻게 해야 합니까?

911로 전화하십시오. 그리고 어떤 일이 발생했고 지금 어디에 있는지 알려주어야 합니다.


사린을 삼킨 경우:

- 911로 전화하십시오.
- 아무 것도 먹거나 마시면 안됩니다.
- 토하려고 시도하지 마십시오.



사린을 **흡입**하거나 **접촉**한 경우에는 신속하게 아래와 같은 조치를 취해야 합니다.

- **그 장소에서 이동해야 합니다.** 집 밖에 있는 경우에는 그 장소를 떠나야 합니다. 집 안에 있는 경우에는 집 밖으로 나가야 합니다. 사린은 지면 가까이에 깔리므로, 가능한 경우, 높은 곳으로 가야 합니다.
- **겉옷을 벗어야 합니다.** 옷을 머리 위로 벗지 말고 **가위로 자르십시오.** 옷의 바깥쪽에 손을 대지 마십시오. 리신이 묻어 있을 수 있습니다.
- **깨끗하게 씻어야 합니다.** 다량의 비누와 물을 사용하십시오. 눈이 타는 듯이 아프거나 흐릿하면 물로 10-15분 동안 씻어내야 합니다.
- **옷을 버려야 합니다.** 몸을 씻은 후에, 고무장갑을 끼거나 플라스틱 백으로 손을 덮고 입고 있던 옷을 다른 플라스틱 백에 넣어서 버려야 합니다.
- **플라스틱 백을 봉해야 합니다.** 그 다음에 그 플라스틱 백을 다른 플라스틱 백 안에 넣어 봉해야 합니다. (긴급 구조 요원에게 플라스틱 백을 버린 곳을 알려 주십시오.)



더 자세한 정보를 원하시면...

아래의 번호로 CDC(질병 통제 센터)로 전화하여 영어나 스페인어로 도움을 받으십시오.

800-CDC-INFO (800-232-4636)
888-232-6348 (TTY)

또는 다음의 웹사이트를 방문하십시오.

www.cdc.gov/sarin
www.dhs.ca.gov/epo