

ແກ້ສຄລໍຣິນແມ່ນຫຍັງ?

ແກ້ສຄລໍຣິນມາຈາກທາດຄລໍຣິນ ເຊິ່ງເປັນສານທີ່ນຳໃຊ້ໃນ ໂຮງຈັກໂຮງງານ, ໃນຫ້ອງທົດລອງ, ແລະ ໃນເຄື່ອງຜະລິດຕະພັນ ບາງຢ່າງທີ່ໃຊ້ໃນເຮືອນຊານ. ເມື່ອຄລໍຣິນເປັນທາດແຫລວແລ້ວ ປະສົມກັບອາກາດ ມັນກາຍເປັນແກ້ສຄລໍຣິນ.

ແກ້ສຄລໍຣິນມີລັກສະນະແນວໃດ?

- ແກ້ສຄລໍຣິນມີສີເຫລືອງອອກຂຽວແລະມີກິ່ນແຮງເຊັ່ນດຽວກັບ ຢາຊັກຟອກ, ແລະ
- ມັນແລ່ນນຳພື້ນດິນແລະຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ.

ຂ້າພະເຈົ້າອາດຈະຖືກແກ້ສຄລໍຣິນໄດ້ແນວໃດ?

ທ່ານອາດຈະຖືກແກ້ສຄລໍຣິນ ຖ້າຫາກວ່າ:

- ທ່ານປະສົມຢາຊັກຟອກກັບຢາຜະລິດຕະພັນອື່ນໆທີ່ໃຊ້ທຳ ຄວາມສະອາດ,
- ເກີດມີອຸປະຕິເຫດອຸດສາຫະກຳ, ຫລື
- ຜູ້ກຳການຮ້າຍໄດ້ປ່ອຍແກ້ສຄລໍຣິນໃນອາກາດ.

ແກ້ສຄລໍຣິນອັນຕະລາຍບໍ່?

ອັນຕະລາຍ. ແກ້ສຄລໍຣິນແມ່ນສານພິດ. ທ່ານສາມາດຕາຍໄດ້ ຖ້າຫາຍໃຈເອົາສານນີ້.

ມີອາການແນວໃດແດ່?

ແກ້ສຄລໍຣິນໃນປະລິມານຫລາຍສາມາດເກີດອາການຕໍ່ໄປນີ້ຢ່າງ ໄວວາ:

- ແສບດັງ, ຄໍ, ແລະ ຕາ
- ຜິວໜັງເຈັບແສບ, ແດງ, ແລະ ໂພງ
- ນ້ຳຕາໄຫລ, ຕາມົວ
- ໄອແລະຫາຍໃຈຜິດ
- ບວດຮາກແລະຮາກ


ແກ້ສຄລໍຣິນໃນປະລິມານໜ້ອຍ, ອາການອາດຈະສະແດງ ອອກຕາມຫລັງ.

ຖ້າຫາຍໃຈເອົາແກ້ສຄລໍຣິນເຂົ້າໄປ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຕາຍບໍ່?

ບັນຫານີ້ຈະຂຶ້ນກັບປະລິມານທີ່ທ່ານຫາຍໃຈເອົາ. ຖ້າທ່ານລອດ ຊີວິດ, ທ່ານກໍຕ້ອງໄດ້ຢູ່ໂຮງໝໍເພື່ອຮັບການປິ່ນປົວຕໍ່ໄປ.

ຈະເຮັດແນວໃດ ຖ້າຫາກຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ ສຳພັດກັບແກ້ສຄລໍຣິນແລ້ວ?

- ຫຍັບອອກໄປ.
- ແກ້ເຄື່ອງນຸ່ງອອກ, ປິດເກີບແລະແວ່ນຕາ ຫລືຄອນແທັກເລັນ ອອກ. ພະຍາຍາມບໍ່ແກ້ເຄື່ອງນຸ່ງອອກທາງຫົວເພາະເຄື່ອງນຸ່ງ ອາດມີທາດຄລໍຣິນຕິດຢູ່ນຳ. ໃຫ້ຕັດເຄື່ອງນຸ່ງອອກແທນການ ແກ້ອອກ.



- ອາບນ້ຳ ຫລືເຊັດຕົນໂຕ. ຖ້າມີສະບູໃຫ້ໃສ່ ສະບູຫລາຍໆ.
- ຖ້າແສບຕາໃຫ້ເອົານ້ຳເທໃສ່ຕາປະມານ 10 ເຖິງ 15 ນາທີ. ຖ້າໄດ້ລ້າງແວ່ນຕາ ທ່ານສາມາດໃສ່ຕໍ່ໄດ້ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ໃສ່ຄອນແທັກເລັນຄູ່ນັ້ນອີກ.

- **ໂທຫາ 911 ທັນທີເພື່ອຮັບ ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອທາງການແພດ!**



ຈາກນັ້ນຂໍໃຫ້ເຮັດສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

- ເອົາເຄື່ອງນຸ່ງແລະຄອນແທັກເລັນທີ່ຕິດສານພິດໃສ່ຖົງຢ່າງ ແລ້ວອັດໃຫ້ແຈບ. (ໃສ່ຖົງມີຢາງ ຫລືຖົງຢາງເພື່ອປ້ອງກັນມື.) ໃສ່ຖົງຢາງນັ້ນໃນອີກຖົງຢາງໜຶ່ງແລ້ວອັດໃຫ້ແຈບ.
- ແຈ້ງໜ່ວຍງານສຸກເສີນບ່ອນທີ່ທ່ານປະຖົງນັ້ນໄວ້.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຂໍໃຫ້ຕິດຕໍ່ ...

ໂທຫາ CDC (Centers for Disease Control) ສຳລັບຂໍ້ມູນ ທີ່ເປັນພາສາອັງກິດ:
800-CDC-INFO (800-232-4636)
888-232-6348 (TTY)

ຫລືເຂົ້າໄປ: www.bt.cdc.gov/chemical
www.dhs.ca.gov/epo