

Warning!

If you are taking any medicines on this list, you need to **call 211 or your doctor right away.**

- Digoxin – a heart medicine
- Probenecid – for gout
- Diabetes medicines, insulin or pills
- Rifampin – for tuberculosis
- Coumadin or warfarin – blood thinner
- Accutane – for acne
- Theophylline – a breathing medicine
- Dilantin, barbiturates, or carbamazepine – seizure medicines
- Lithium – for mental health
- Cyclosporine – for immune system problems
- Methotrexate – for arthritis, cancer, psoriasis or lupus
- Requip – for Parkinson’s disease

Taking the emergency antibiotics with any of these medicines may cause serious, even life threatening, side effects.

Your doctor may want to change the medicine or the amount you take, or the doctor may want you to have more tests.

警告！

以下の薬を服用している場合は、直ちに 211 番または主治医に連絡してください。

- ジゴキシシン – 心臓の薬
- プロベネシド – 痛風薬
- 糖尿病薬、インシュリン、または錠剤
- リファピン – 結核薬
- クマディンまたはワーファイン – 抗血液凝固剤
- アキュテイン – にきび薬
- テオフィリン – 気管支喘息の治療薬
- ダイランチン、バルビツール酸系催眠薬、またはカルバマゼピン – 抗けいれん薬
- リチウム – 精神障害治療薬
- シクロスポリン – 免疫抑制薬
- メトトレキサート – 抗リウマチ剤、抗ガン剤、乾癬またはループスの治療薬
- リキップ – パーキンソン病治療薬

これらの薬と緊急抗生物質を併用すると、生命に関わる深刻な副作用を引き起こす危険があります。

主治医が薬や服用量を変更したり、精密検査を実施する場合があります。